

JAえひめ未来「ときめき水都市」

栽培管理日誌

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。
 ※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員 確認欄	/	印
------------	---	---

会員番号		氏名		栽培面積	
作物名	キウイフルーツ	栽培圃場地番			m ²
播種日	月 日	定植日	月 日	収穫開始日	月 日

<作業/施肥> (※50kg/10a = 50g/1m², 100ℓ/10a = 100mℓ/1m²)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。 登録内容：2021.4現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病害虫	使用 時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
石灰硫黄合剤 (7~10倍・300ℓ/10a)	カイガラムシ類 ハダニ類	発芽前	月 日	月 日	月 日
アグレプト水和剤 (1000倍・350ℓ/10a) 4回	かいよう病 花腐細菌病	90日前	月 日	月 日	月 日
スプラサイド水和剤 (1500倍・350ℓ/10a)	クワシロカイガラムシ	60日前	月 日	月 日	月 日
ダコニール1000 (500倍・350ℓ/10a) 7回	果実軟腐病 すす斑病	60日前	月 日	月 日	月 日
トップジンM水和剤 (1000倍・350ℓ/10a) 5回	果実軟腐病	前日	月 日	月 日	月 日
フルメット液剤 (ホルクロールフェニユロン1~5ppm)	(果実肥大促進)	開花後 20~ 30日	月 日		
フェニックスフロアブル (4000倍・350ℓ/10a)	キイロマイコガ ハマキムシ類	7日前	月 日	月 日	月 日
モスピラン顆粒水溶剤 (2000倍・350ℓ/10a)	カイガラムシ類	7日前	月 日	月 日	月 日
アデオオン乳剤 (2000倍・350ℓ/10a) 5回	カメムシ類 キイロマイコガ	7日前	月 日	月 日	月 日
アグリマイシン-100 (1000倍・350ℓ/10a)	花腐細菌病 かいよう病	落花期 まで	月 日	月 日	月 日
ベンレート水和剤 (2000倍・350ℓ/10a) 5回	果実軟腐病 すす斑病	7日前	月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。
 ※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。