

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。
 ※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員 確認欄	/	印
------------	---	---

会員番号		氏名		栽培面積	
作物名	キャベツ	栽培圃場地番			m ²
播種日	月 日	定植日	月 日	収穫開始日	月 日

<作業/施肥> (※50kg/10a = 50g/1m², 100ℓ/10a = 100mℓ/1m²)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。 登録内容：2021.4現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病害虫	使用 時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
アクタラ粒剤5 (2g/株) 株元散布	コナガ、アブラムシ類 ハイマダラノメイガ、 アオムシ	育苗期 後半	月 日		
グレースシア乳剤 (2000倍・100ℓ/10a)	コナガ、アオムシ、アブラムシ類 ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハイマダラノメイガ、アオムシ	7日前	月 日	月 日	
コルト顆粒水和剤 (3000倍・100ℓ/10a)	アブラムシ類、 ネギアザミウマ	前日	月 日	月 日	月 日
コテツフロアブル (2000倍・100ℓ/10a)	ヨトウムシ、コナガ ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、アオムシ ハイマダラノメイガ、アオムシ	前日	月 日	月 日	
アフーム乳剤 (1000倍・100ℓ/10a)	アオムシ、コナガ、 ハイマダラノメイガ、 ヨトウムシ	前日	月 日	月 日	月 日
オラクル粉剤 (30kg/10a:全面土壌混和)	根こぶ病	定植前	月 日	月 日	
スターナ水和剤(治) (1000倍・100ℓ/10a)	軟腐病、黒斑細菌病	7日前	月 日	月 日	月 日
キノンドーフロアブル(予) (800倍・100ℓ/10a)	黒腐病	14日前	月 日	月 日	月 日
トップジンM水和剤(治) (1000倍・100ℓ/10a)	菌核病、株腐病 根朽病	3日前	月 日	月 日	
カンタスドライフロアブル(治) (1500倍・100ℓ/10a)	株腐病、菌核病 黒斑病	7日前	月 日	月 日	
カスミンボルドー(治) (1000倍・100ℓ/10a) 4回	黒腐病、黒斑細菌病、 軟腐病	7日前	月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。
 ※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。