

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。
 ※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

| | | |
|------------|---|---|
| 指導員 確認欄 | / | 印 |
|------------|---|---|

| | | | | | |
|------|----------|-----|--------|-------|----------------|
| 会員番号 | | 氏名 | | 栽培面積 | m ² |
| 作物名 | フロー豆・ささげ | | 栽培圃場地番 | | |
| 播種日 | 月 日 | 定植日 | 月 日 | 収穫開始日 | 月 日 |

<作業/施肥> (※50kg/10a = 50g/1m²、100ℓ/10a = 100mℓ/1m²)

| 作業日/施用日 | 作業名/肥料名・施用量(kg) | 作業日/施用日 | 作業名/肥料名・施用量(kg) |
|---------|-----------------|---------|-----------------|
| 月 日 | | 月 日 | |
| 月 日 | | 月 日 | |
| 月 日 | | 月 日 | |

農薬は散布しましたか？ はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。 登録内容：2021.4現在

| 農薬名 (希釈倍数・使用量) | 対象病害虫 | 使用 時期 | 使用月日 | | |
|--------------------------------------|--|------------------|------|-----|-----|
| | | | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
| アドマイヤー1粒剤 (は種時：3kg/10a、定植時：2g/植穴) | アブラムシ類 (播溝/植穴土壌混和) (植穴は6kg/10aまで) | は種時/ 定植時 | 月 日 | | |
| ダイアジノン粒剤5 (6kg/10a) 全面/作条土壌混和 | コガネムシ類幼虫 | は種時 又は定 植時 | 月 日 | 月 日 | |
| アデオン乳剤 (3000倍・100ℓ/10a) | アザミウマ類、アザキノメイガ、アブラムシ類、ウナギシジミ、ハダカバエ類、マユツバガ、ヨトウ類 | 14日前 | 月 日 | 月 日 | |
| スタークル顆粒水溶剤 (2000倍・100ℓ/10a) | アブラムシ類 ハモグリバエ類 | 前日 | 月 日 | 月 日 | |
| プレオフロアブル (1000倍・100ℓ/10a) | オオタバコガ、シロイチモジ ヨトウ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類 | 前日 | 月 日 | 月 日 | |
| グレースシア乳剤 (2000倍・100ℓ/10a) | ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 | 前日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| スミチオン乳剤 (1000倍・100ℓ/10a) 4回 | アブラムシ類、カメムシ類、ヨドバシマダラメイガ、ダババエ、マユツバガ、マヒメアザミウマ | 21日前 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| アフエットフロアブル (2000倍・100ℓ/10a) | 菌核病、さび病、灰色かび病 | 前日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| セイビアーフロアブル20 (1000倍・100ℓ/10a) | 灰色かび病 | 前日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| ラリー水和剤 (4000倍・150ℓ/10a) | うどんこ病 | 前日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| Zボルドー(予) (500倍・100ℓ/10a) | べと病、軟腐病、黒腐病 褐斑細菌病、黒斑細菌病 斑点細菌病 | - | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| (倍・ ℓ) | | | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| (倍・ ℓ) | | | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| (倍・ ℓ) | | | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| (倍・ ℓ) | | | 月 日 | 月 日 | 月 日 |

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。
 ※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。