

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。
 ※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員 確認欄	/	印
------------	---	---

会員番号		氏名		栽培面積	m ²
作物名	愛媛果試第28号(柑橘)		栽培圃場地番		
播種日	月 日	定植日	月 日	収穫開始日	月 日

<作業/施肥> (※50kg/10a = 50g/1m², 100ℓ/10a = 100mℓ/1m²)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

農薬は散布しましたか？ はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。 登録内容：2022.5現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病害虫	使用時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
スタークル顆粒水溶剤 (1000倍・200ℓ/10a)	チャノキロアザミウマ コナカイガラムシ類 アブラムシ類(2000倍)	前日	月 日	月 日	月 日
コテツフロアブル (2000倍・200ℓ/10a)	アザミウマ類、ミカンハダニ チャノホコリダニ ミカンサビダニ	前日	月 日	月 日	
コルト顆粒水和剤 (3000倍・200ℓ/10a)	コナジラミ類、ミカンハダニ アブラムシ類(4000倍) カガムシ類(2000倍)	前日	月 日	月 日	月 日
カスケード乳剤 (1000倍・200ℓ/10a)	ミカンハダニ ミカンハダニ(2000倍) チャノホコリダニ(2000倍)	7日前	月 日	月 日	
ダニサラバフロアブル (1000倍・200ℓ/10a)	ミカンハダニ	前日	月 日	月 日	
マイトコーネフロアブル (1000倍・200ℓ/10a)	ミカンサビダニ ミカンハダニ	7日前	月 日		
ジマンダイセン水和剤(予) (600倍・200ℓ/10a) 4回	黒点病、汚れ果症、幹腐病 炭疽病(さび果) 褐色腐敗病、そばかす病	90日前	月 日	月 日	月 日
ランマンフロアブル(予) (2000倍・200ℓ/10a)	褐色腐敗病	前日	月 日	月 日	月 日
ロブール水和剤(予) (1000倍・200ℓ/10a)	灰色かび病 黄斑病 黒腐病	7日前	月 日	月 日	月 日
トップジンM水和剤(治) (2000倍・200ℓ/10a) 5回	貯蔵病害 (緑かび病、青かび病、 軸腐病)	前日	月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。
 ※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。