

# JAえひめ未来「ときめき水都市」

# 栽培管理日誌

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。  
 ※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員 確認欄	/	印
------------	---	---

会員番号		氏名		栽培面積	m <sup>2</sup>
作物名	キウイフルーツ		栽培圃場地番		
播種日	月 日	定植日	月 日	収穫開始日	月 日

<作業/施肥> (※50kg/10a = 50g/1m<sup>2</sup>、100ℓ/10a = 100mℓ/1m<sup>2</sup>)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

**農薬は散布しましたか？**      はい      ・      いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。      登録内容：2022.5現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病害虫	使用 時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
ICボルドー66D (50倍・350ℓ)	かいよう病	収穫後 ～ 発芽前	月 日	月 日	月 日
コサイド3000 (2000倍・350ℓ)	かいよう病(収穫後～果実肥大期) 花腐細菌病(休眠期～叢生期[新梢 長約10cm])	←	月 日	月 日	月 日
コルト顆粒水和剤 (3000倍・350ℓ)	クワシロカイガラムシ	前日	月 日	月 日	月 日
アリエッティ水和剤 (600倍・350ℓ)	果実軟腐病(幼果期まで但し 収穫120日前まで)	←	月 日	月 日	
パダンSG水溶剤 (1500倍・350ℓ)	キイロマイコガ キウイヒメヨコバイ	30日	月 日	月 日	月 日
トップジンM水和剤 (1000倍・350ℓ) 5回	果実軟腐病	前日	月 日	月 日	月 日
アプロード水和剤 (1000倍・350ℓ)	カイガラムシ類幼虫 キウイヒメヨコバイ	前日	月 日	月 日	
ベルコート水和剤 (1000倍・350ℓ) 5回	果実軟腐病 貯蔵病害(灰色かび病) 灰色かび病	前日	月 日	月 日	月 日
ロブラール水和剤 (1500倍・350ℓ) 4回	果実軟腐病 貯蔵病害(灰色かび病) 灰色かび病(開花期～落花期)	前日	月 日	月 日	月 日
(      倍・      ℓ)			月 日	月 日	月 日
(      倍・      ℓ)			月 日	月 日	月 日
(      倍・      ℓ)			月 日	月 日	月 日
(      倍・      ℓ)			月 日	月 日	月 日
(      倍・      ℓ)			月 日	月 日	月 日
(      倍・      ℓ)			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。  
 ※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。