

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。
 ※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員 確認欄	/	印
------------	---	---

会員番号		氏名		栽培面積	
					m ²
作物名	ぶどう (果樹)		栽培圃場地番		
播種日	月 日	定植日	月 日	収穫開始日	月 日

<作業/施肥> (※50kg/10a = 50g/1m²、100ℓ/10a = 100mℓ/1m²)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。登録内容：2022.5現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病害虫	使用 時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
アクタラ顆粒水溶剤 (2000倍・200ℓ/10a)	コナカイガラムシ類・チャノ キイロアザミウマ・フタテン ヒメヨコバイ	7日前	月 日	月 日	
スタークル顆粒水溶剤 (1000倍・200ℓ/10a)	カイロアザミウマ類、コナカイガラムシ類、 カミキリ類(2000倍)、ブドウ トガサキ(2000倍)	前日	月 日	月 日	月 日
ダントツ水溶剤 (2000倍・200ℓ/10a)	コナカイガラムシ類、カイロアザミウマ類、 フタテヒメヨコバイ、ブドウトガサキ 類、カミキリ類、コナカイガラムシ類	前日	月 日	月 日	月 日
スターマイトフロアブル (2000倍・200ℓ/10a)	ハダニ類	14日前	月 日		
アフエツフロアブル(治) (2000倍・200ℓ/10a)	灰色かび病、晩腐病 黒とう病、うどんこ病 褐斑病、さび病	7日前	月 日	月 日	月 日
ジマンダイセン水和剤(予) (1000倍・200ℓ/10a)	晩腐病、褐斑病、さび病、ペ ト病、黒とう病	45日前	月 日	月 日	
ベンレート水和剤(治) (2000倍・200ℓ/10a)	褐斑病、うどんこ病、灰色か び病、晩腐病、黒とう病、芽 枯病	45日前	月 日	月 日	月 日
ホライズンドライフロアブル(治) (2500倍・200ℓ/10a)	ペト病、晩腐病、黒とう病、 褐斑病	21日前	月 日	月 日	月 日
レーバスフロアブル(治) (2000倍・200ℓ/10a)	ペト病	7日前	月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。
 ※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。

トップジンM水和剤 (1000倍・200ℓ/10a)	灰色かび病、褐斑病 黒とう病、うどんこ病	45日前	月 日		
アザミウマ水和剤 (1000倍・200ℓ/10a) 4回	アザミウマ類、ハダニ類 フタテンヒメヨコバイ	7日前	月 日	月 日	月 日
コテツフロアブル (2000倍・200ℓ/10a)	カイロアザミウマ類、フタテヒメヨコ バイ、コナカイガラムシ類、ブドウ トガサキ類	60日前	月 日	月 日	
ダニサラハフロアブル (1000倍・200ℓ/10a)	ハダニ類 ブドウヒメハダニ	前日	月 日	月 日	