

# JAえひめ未来「ときめき水都市」

# 栽培管理日誌

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。  
 ※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 指導員<br>確認欄 | / | 印 |
|------------|---|---|

|      |          |     |        |       |     |
|------|----------|-----|--------|-------|-----|
| 会員番号 |          | 氏名  |        | 栽培面積  |     |
| 作物名  | フロー豆・ささげ |     | 栽培圃場地番 |       |     |
| 播種日  | 月 日      | 定植日 | 月 日    | 収穫開始日 | 月 日 |

<作業/施肥> (※50kg/10a = 50g/1㎡, 100ℓ/10a = 100mℓ/1㎡)

| 作業日/施用日 | 作業名/肥料名・施用量(kg) | 作業日/施用日 | 作業名/肥料名・施用量(kg) |
|---------|-----------------|---------|-----------------|
| 月 日     |                 | 月 日     |                 |
| 月 日     |                 | 月 日     |                 |
| 月 日     |                 | 月 日     |                 |

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。 登録内容：2022.5現在

| 農薬名<br>(希釈倍数・使用量)                      | 対象病害虫                                     | 使用<br>時期         | 使用月日 |     |     |
|--|---|------------------|------|-----|-----|
|  |   |                  | 1回目  | 2回目 | 3回目 |
| アドマイヤー1粒剤<br>(は種時: 3kg/10a、定植時: 2g/植穴) | アブラムシ類<br>(播溝/植穴土壌混和)<br>(植穴は6kg/10aまで)   | は種時/<br>定植時      | 月 日  |     |     |
| ダイアジノン粒剤5<br>(6kg/10a) 全面又は作条土壌混和      | コガネムシ類幼虫                                  | は種時<br>又は定<br>植時 | 月 日  | 月 日 |     |
| アデオン乳剤<br>(3000倍・100ℓ/10a)             | アミ類、アキメイト、アブラムシ類、ウナミシ、ハダカバエ類、マメツクガ、ヨトウ類   | 14日前             | 月 日  | 月 日 | 月 日 |
| スタークル顆粒水溶剤<br>(2000倍・100ℓ/10a)         | アブラムシ類<br>ハモグリバエ類                         | 前日               | 月 日  | 月 日 |     |
| プレオフロアブル<br>(1000倍・100ℓ/10a)           | オオタバコガ、シロイチモシヨトウ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類          | 前日               | 月 日  | 月 日 |     |
| グレースシア乳剤<br>(2000倍・100ℓ/10a)           | ハスモンヨトウ<br>ハモグリバエ類                        | 前日               | 月 日  | 月 日 |     |
| スミチオン乳剤<br>(1000倍・100ℓ/10a) 4回         | アブラムシ類、カメムシ類、ヨコイトマダツクガ、ダババエ、マメツクガ、マヒメヤマトガ | 21日前             | 月 日  | 月 日 | 月 日 |
| アフエットフロアブル<br>(2000倍・100ℓ/10a)         | 菌核病、さび病、灰色かび病                             | 前日               | 月 日  | 月 日 | 月 日 |
| セイビアーフロアブル20<br>(1000倍・100ℓ/10a)       | 灰色かび病                                     | 前日               | 月 日  | 月 日 | 月 日 |
| ラリー水和剤<br>(4000倍・150ℓ/10a)             | うどんこ病                                     | 前日               | 月 日  | 月 日 | 月 日 |
| Zボルドー(予)<br>(500倍・100ℓ/10a)            | べと病、軟腐病、黒腐病<br>褐斑細菌病、黒斑細菌病<br>斑点細菌病       | -                | 月 日  | 月 日 | 月 日 |
| ( 倍・ ℓ )                               |   |                  | 月 日  | 月 日 | 月 日 |
| ( 倍・ ℓ )                               |   |                  | 月 日  | 月 日 | 月 日 |
| ( 倍・ ℓ )                               |   |                  | 月 日  | 月 日 | 月 日 |
| ( 倍・ ℓ )                               |   |                  | 月 日  | 月 日 | 月 日 |

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。  
 ※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。