

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。  
 ※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員  
確認欄

/

印

会員番号		氏名		栽培面積		m <sup>2</sup>
作物名	うめ(梅・果樹)		栽培圃場地番			
播種日	月	日	定植日	月	日	収穫開始日
						月
						日

&lt;作業/施肥&gt;

(※50kg/10a = 50g/1m<sup>2</sup>、100ℓ/10a = 100mℓ/1m<sup>2</sup>)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。

登録内容: 2024.4現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病虫害	使用時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
マシン油乳剤95 (12~14倍)	カイガラムシ類	-	月 日	月 日	月 日
スタークル顆粒水溶剤 (2000倍・200ℓ/10a)	アブラムシ類 カメムシ類 シンクイムシ類	前日	月 日	月 日	月 日
フェニックス顆粒水和剤 (4000倍・200ℓ/10a)	ケムシ類 コスカシバ	前日	月 日	月 日	
モスピラン顆粒水溶剤 (2000倍・200ℓ/10a)	カイガラムシ類、アブラムシ類 クビアカツヤカミキリ ノミガ 群、クサキイ類	前日	月 日	月 日	月 日
コルト顆粒水和剤 (2000倍・200ℓ/10a)	カイガラムシ類 アブラムシ類	前日	月 日	月 日	月 日
バルコート水和剤(予) (2000倍・200ℓ/10a)	枝枯病、環紋葉枯病 黒星病、すす斑病 灰色かび病、灰星病	30日前	月 日	月 日	月 日
ベンレート水和剤(予+治) (3000倍・200ℓ/10a)	黒星病 すす斑病	7日前	月 日		
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。

※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。