

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。
※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員
確認欄

/

印

| | | | | | | | | |
|------|-------|----|--------|------|---|----------------|---|---|
| 会員番号 | | 氏名 | | 栽培面積 | | m ² | | |
| 作物名 | らっきょう | | 栽培圃場地番 | | | | | |
| 播種日 | 月 | 日 | 定植日 | 月 | 日 | 収穫開始日 | 月 | 日 |

<作業/施肥>

(*50kg/10a = 50g/1m², 100ℓ/10a = 100mℓ/1m²)

| 作業日/施用日 | 作業名/肥料名・施用量(kg) | 作業日/施用日 | 作業名/肥料名・施用量(kg) |
|---------|-----------------|---------|-----------------|
| 月 | 日 | 月 | 日 |
| 月 | 日 | 月 | 日 |
| 月 | 日 | 月 | 日 |

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れ 灰色かび病

登録内容: 2024.4現在

| 農薬名 (希釈倍数・使用量) | 対象病害虫 | 使用 時期 | 使用月日 | | | |
|---|--------|----------|------|-----|-----|---|
| | | | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |
| モスピラン顆粒水溶剤 (2000倍・100ℓ/10a) | アザミウマ類 | 14日前 | 月 | 日 | 月 | 日 |
| ダコニール1000(予) (1000倍・100ℓ/10a) | 灰色かび病 | 14日前 | 月 | 日 | 月 | 日 |
| アミスター20フロアブル(治) (2000倍・100ℓ/10a) | さび病 | 3日前 | 月 | 日 | 月 | 日 |
| トップジンM水和剤 (1000倍・700ml/m ²) 株元灌注 | 乾腐病 | 7日前 | 月 | 日 | 月 | 日 |
| ランマンフロアブル(予) (2000倍・100ℓ/10a) 4回 | 白色疫病 | 3日前 | 月 | 日 | 月 | 日 |
| フォリオゴールド(治) (1000倍・100ℓ/10a) | 白色疫病 | 14日前 | 月 | 日 | 月 | 日 |
| (倍・ ℓ) | | | 月 | 日 | 月 | 日 |
| (倍・ ℓ) | | | 月 | 日 | 月 | 日 |
| (倍・ ℓ) | | | 月 | 日 | 月 | 日 |
| (倍・ ℓ) | | | 月 | 日 | 月 | 日 |
| (倍・ ℓ) | | | 月 | 日 | 月 | 日 |
| (倍・ ℓ) | | | 月 | 日 | 月 | 日 |
| (倍・ ℓ) | | | 月 | 日 | 月 | 日 |
| (倍・ ℓ) | | | 月 | 日 | 月 | 日 |
| (倍・ ℓ) | | | 月 | 日 | 月 | 日 |
| (倍・ ℓ) | | | 月 | 日 | 月 | 日 |

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。
※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。