

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。
※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員
確認欄

/

印

会員番号		氏名		栽培面積		m ²		
作物名	キウイフルーツ		栽培圃場地番					
播種日	月	日	定植日	月	日	収穫開始日	月	日

<作業/施肥>

(※50kg/10a = 50g/1m²、100ℓ/10a = 100mℓ/1m²)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。

登録内容: 2024.4現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病虫害	使用 時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
ICボルドー66D(予) (50倍・200ℓ)	かいよう病	収穫後 ～ 発芽前	月 日	月 日	月 日
コサイド3000(予) (2000倍・200ℓ)	かいよう病(収穫後～果実肥大期) 花腐細菌病(休眠期～養生期[新梢 長約10cm])	←	月 日	月 日	月 日
コルト顆粒水和剤 (3000倍・200ℓ) 3回	クワシロカイガラムシ	前日	月 日	月 日	月 日
アリエッティ水和剤(予+治) (600倍・200ℓ)	果実軟腐病(幼果期まで但し 収穫120日前まで)	←	月 日	月 日	
パダンSG水溶剤 (1500倍・200ℓ) 3回	キイロマイコガ キウイヒメヨコバイ	30日	月 日	月 日	月 日
トップジンM水和剤(予+治) (1000倍・200ℓ) 5回	果実軟腐病	前日	月 日	月 日	月 日
アプロード水和剤 (1000倍・200ℓ) 2回	カイガラムシ類幼虫 キウイヒメヨコバイ	前日	月 日	月 日	
ベルコート水和剤(予+治) (1000倍・200ℓ) 5回	果実軟腐病 貯蔵病害(灰色かび病) 灰色かび病	前日	月 日	月 日	月 日
ロブラール水和剤(予+治) (1500倍・350ℓ) 4回	果実軟腐病 貯蔵病害(灰色かび病) 灰色かび病(開花期～落花期)	前日	月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。

※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。