

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。
※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員
確認欄

/

印

会員番号		氏名		栽培面積		m ²		
作物名	さやいんげん		栽培圃場地番					
播種日	月	日	定植日	月	日	収穫開始日	月	日

<作業/施肥>

(*50kg/10a = 50g/1m², 100ℓ/10a = 100mℓ/1m²)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。登録内容: 2024.4現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病虫害	使用 時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
アドマイヤー1粒剤 (2g/株、6kg/10aまで) 植穴土壌混和	アブラムシ類	定植時 又は は種時	月 日		
モスピラン顆粒水溶剤 (4000倍・100ℓ/10a)	アブラムシ類(2000倍)、カ メムシ類、アザミウマ類、コ ナジラミ類	前日	月 日	月 日	月 日
カスケード乳剤 (2000倍・100ℓ/10a)	マメハモグリバエ ハスモンヨトウ(4000倍)	前日	月 日	月 日	
アフーム乳剤 (2000倍・100ℓ/10a)	ハモグリバエ類	前日	月 日	月 日	
セイビアーフロアブル20(予) (1000倍・100ℓ/10a)	灰色かび病、菌核病	前日	月 日	月 日	月 日
カンタスドライフロアブル(治) (1000倍・100ℓ/10a)	灰色かび病、菌核病	前日	月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。
※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。