

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。
 ※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員
確認欄

/

印

会員番号		氏名		栽培面積		m ²		
作物名	そらまめ(空豆)・一寸蚕豆		栽培圃場地番					
播種日	月	日	定植日	月	日	収穫開始日	月	日

<作業/施肥>

(※50kg/10a = 50g/1m²、100ℓ/10a = 100mℓ/1m²)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。

登録内容: 2024.4現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病虫害	使用 時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
アドマイヤー1粒剤 (2g/植穴、但し6kg/10aまで)	アブラムシ類 (植穴土壌混和)	定植時	月 日		
アディオソ乳剤 (3000倍・100ℓ/10a)	アブラムシ類、アザミウマ類 ハモグリハエ類、ウツミツミ ヨトウムシ類、マツツカ	7日前	月 日	月 日	月 日
スミチオン乳剤 (1000倍・100ℓ/10a)	アブラムシ類、カメムシ類 ヨイモリ、マダラメイ ダ、イサバガ、マツツカ	3日前	月 日	月 日	月 日
カスケード乳剤 (2000倍・100ℓ/10a)	マメハモグリハエ ハスモンヨトウ(4000倍)	前日	月 日	月 日	月 日
ロプラール水和剤(予) (1000倍・100ℓ/10a)	赤色斑点病	前日	月 日	月 日	月 日
ジマンダイセン水和剤(予) (400倍・100ℓ/10a)	さび病、輪紋病	30日前	月 日	月 日	月 日
アフェットフロアブル(治) (2000倍・100ℓ/10a)	灰色かび病、さび病 菌核病	前日	月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。

※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。