

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。  
 ※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員  
確認欄

/

印

会員番号		氏名		栽培面積		m <sup>2</sup>		
作物名	チンゲン菜		栽培圃場地番					
播種日	月	日	定植日	月	日	収穫開始日	月	日

&lt;作業/施肥&gt;

(※50kg/10a = 50g/1m<sup>2</sup>、100ℓ/10a = 100mℓ/1m<sup>2</sup>)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

農薬は散布しましたか？ はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。

登録内容：2024.4現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病虫害	使用 時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
モスピラン粒剤 (0.5g/株) 株元散布	アオムシ、アブラムシ類 キスジノミハムシ コナガ	定植 当日	月 日		
フォース粒剤 (4kg/10a) 全面土壌混和	キスジノミハムシ ネキリムシ類	は種時	月 日		
コテツフロアブル (2000倍・100ℓ/10a)	コナガ	7日前	月 日		
プレオフロアブル (1000倍・100ℓ/10a)	コナガ ハスモンヨトウ	7日前	月 日	月 日	
アニキ乳剤 (1000倍・100ℓ/10a)	キスジノミハムシ コナガ、ハスモンヨトウ ハモグリハエ類	前日	月 日	月 日	月 日
アミスター20フロアブル (2000倍・100ℓ/10a)	白さび病	7日前	月 日	月 日	
スターナ水和剤 (1000倍・100ℓ/10a)	軟腐病	7日前	月 日	月 日	
ベンレート水和剤 (4000倍・100ℓ/10a)	炭疽病 白斑病	7日前	月 日		
ランマンフロアブル (2000倍・100ℓ/10a)	白さび病	3日前	月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。

※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。