

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。
 ※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員
確認欄

/

印

会員番号		氏名		栽培面積		m ²		
作物名	トマト		栽培圃場地番					
播種日	月	日	定植日	月	日	収穫開始日	月	日

<作業/施肥>

(※50kg/10a = 50g/1m²、100ℓ/10a = 100mℓ/1m²)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。

登録内容: 2024.4現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病虫害	使用 時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
アドマイヤー1粒剤 (2g/株) 植穴土壌混和	アブラムシ類 コナジラミ類	定植時	月 日		
コルト顆粒水和剤 (4000倍・200ℓ/10a)	アブラムシ類 コナジラミ類	前日	月 日	月 日	月 日
モスピラン顆粒水溶剤 (2000倍・200ℓ/10a)	アブラムシ類、コナジラミ類 アザミウマ類	前日	月 日	月 日	月 日
ウララDF (2000倍・200ℓ/10a)	コナジラミ類 ミカンキイロアザミウマ アブラムシ類	前日	月 日	月 日	月 日
グレースシア乳剤 (2000倍・200ℓ/10a)	アザミウマ類、材木カガ、コナジラミ類、トマトビダニ、トマトハダカバエ、ハダカヨトリ	前日	月 日	月 日	
アフエットフロアブル(治) (2000倍・200ℓ/10a)	うどんこ病、菌核病 すすかび病、灰色かび病 葉かび病	前日	月 日	月 日	月 日
ランマンフロアブル(予) (1000倍・200ℓ/10a) 4回	疫病	前日	月 日	月 日	月 日
ロブラール水和剤(予) (1000倍・200ℓ/10a)	斑点病、輪紋病 灰色かび病	前日	月 日	月 日	月 日
トリフミン乳剤(治) (2000倍・200ℓ/10a) 5回	すすかび病、うどんこ病 葉かび病	前日	月 日	月 日	月 日
ホライズンドライフロアブル(治) (1500倍・200ℓ/10a)	葉かび病(2500倍) 疫病	前日	月 日	月 日	月 日
ゲッター水和剤(治) (1000倍・200ℓ/10a) 5回	菌核病、灰色かび病 葉かび病	前日	月 日	月 日	月 日
トップジンM水和剤(予+治) (1500倍・200ℓ/10a) 5回	菌核病、灰色かび病 葉かび病	前日	月 日	月 日	月 日
フォリオゴールド(予+治) (800倍・200ℓ/10a) 4回	疫病、葉かび病	前日	月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。

※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。