

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。
 ※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員
確認欄

/

印

会員番号		氏名		栽培面積		m ²
作物名	なす(茄子)		栽培圃場地番			
播種日	月	日	定植日	月	日	収穫開始日
						月
						日

<作業/施肥>

(※50kg/10a = 50g/1m²、100ℓ/10a = 100mℓ/1m²)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。

登録内容: 2024.4現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病虫害	使用 時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
スタークル粒剤 (2g/株) 植穴土壌混和	コナジラミ類、ハモグリバエ類、アザミウマ類 アブラムシ類(1g/株)	定植時	月 日		
スタークル顆粒水溶剤 (2000倍・200ℓ/10a)	コナジラミ類、アザミウマ類、カメムシ類 アブラムシ類(3000倍)	前日	月 日	月 日	
モベントフロアブル (2000倍・200ℓ/10a)	うどんこ病、アブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類、チャノホコリダニ、ハダニ類	前日	月 日	月 日	月 日
スターマイトフロアブル (2000倍・200ℓ/10a)	ハダニ類 チャノホコリダニ	前日	月 日		
コテツフロアブル (2000倍・200ℓ/10a) 4回	材カガ、チャノホコリダニ、アブラムシ類、ハダニ類、ハダニ類、シジメ、ミナモトガミ、ヨトビ	前日	月 日	月 日	月 日
アフーム乳剤 (2000倍・200ℓ/10a)	アザミウマ類、オオタバコガ、コナジラミ類、チャノホコリダニ、ハスモンヨトウ、ハダニ類、ハモグリバエ	前日	月 日	月 日	
コルト顆粒水和剤 (4000倍・200ℓ/10a)	アブラムシ類 コナジラミ類 カスミカメムシ類	前日	月 日	月 日	月 日
ウララDF (2000倍・200ℓ/10a)	コナジラミ類 アブラムシ類 シジメ	前日	月 日	月 日	月 日
ロブール水和剤(予) (1000倍・200ℓ/10a) 4回	菌核病、黒枯病、すすかび病、灰色かび病、褐色斑点病	前日	月 日	月 日	月 日
スミブレンド水和剤(治) (1500倍・200ℓ/10a) 5回	灰色かび病、菌核病	前日	月 日	月 日	月 日
アフェットフロアブル(治) (2000倍・200ℓ/10a)	うどんこ病、褐色斑点病、褐色円星病、灰色かび病、菌核病、すすかび病	前日	月 日	月 日	月 日
レーバフロアブル(治) (2000倍・200ℓ/10a)	褐色腐敗病	前日	月 日	月 日	月 日
ライメイフロアブル(予) (2000倍・200ℓ/10a)	褐色腐敗病	前日	月 日	月 日	月 日
サフオイル乳剤 (300倍・200ℓ/10a)	うどんこ病、コナジラミ類、チャノホコリダニ、ハダニ類、アブラムシ類	前日	月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。

※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。