

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。  
 ※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員  
確認欄

/

印

会員番号		氏名		栽培面積		m <sup>2</sup>		
作物名	ふき		栽培圃場地番					
播種日	月	日	定植日	月	日	収穫開始日	月	日

<作業/施肥> (※50kg/10a = 50g/1m<sup>2</sup>、100ℓ/10a = 100mℓ/1m<sup>2</sup>)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。 登録内容：2024.4現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病虫害	使用 時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
ダイアジノン粒剤5 (4kg/10a) 株元散布	フキアブラムシ	30日前	月 日	月 日	月 日
アカリタッチ乳剤 (2000倍・100ℓ/10a)	うどんこ病 ハダニ類	前日	月 日	月 日	月 日
デルフィン顆粒水和剤 (1000倍・100ℓ/10a)	オオタバコガ、アオムシ、ハス モンヨトウ、コナガ、シロイチ モシヨトウ、ウリノメイガ	発生 初期 ・前日	月 日	月 日	月 日
オレート液剤 (100倍・150ℓ/10a)	アブラムシ類 コナジラミ類	発生 初期 ・前日	月 日	月 日	月 日
フーモン (1000倍・150ℓ/10a)	うどんこ病、アブラムシ類 コナジラミ類、ハダニ類	前日	月 日	月 日	月 日
サフオイル乳剤 (300倍・150ℓ/10a)	うどんこ病、コナジラミ類、 チャノホコリダニ、ハダニ類	前日	月 日	月 日	月 日
スタークル顆粒水溶剤 (2000倍・100ℓ/10a)	コナジラミ類	7日前	月 日	月 日	
ダコニール1000 (1000倍・100ℓ/10a)	灰色かび病	21日前	月 日	月 日	
カリグリーン(予+治) (800倍・100ℓ/10a)	うどんこ病、さび病 灰色かび病	前日	月 日	月 日	月 日
乙ポルドー(予) (500倍・100ℓ/10a)	べと病、軟腐病、黒腐病 褐斑細菌病、黒斑細菌病 斑点細菌病	-	月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。  
 ※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。