

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。
 ※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員
確認欄

/

印

会員番号		氏名		栽培面積		m ²		
作物名	ぶどう(果樹)		栽培圃場地番					
播種日	月	日	定植日	月	日	収穫開始日	月	日

<作業/施肥> (※50kg/10a = 50g/1m²、100ℓ/10a = 100mℓ/1m²)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。 登録内容：2024.4現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病虫害	使用 時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
アクタラ顆粒水溶剤 (2000倍・200ℓ/10a)	コナカイガラムシ類・チャノ キイロアザミウマ・フタテン ヒメヨコバイ	7日前	月 日	月 日	
スタークル顆粒水溶剤 (1000倍・200ℓ/10a)	チャノアザミウマ、コナカイガラムシ 類、加ムシ類(2000倍)、ブド ウカミナリ(2000倍)	前日	月 日	月 日	月 日
ダントツ水溶剤 (2000倍・200ℓ/10a)	コナカイガラムシ類、チャノアザミウマ、 フタテヒメヨコバイ、ブドウカミ ナリ、加ムシ類、カミシラミ類	前日	月 日	月 日	月 日
スターマイトフロアブル (2000倍・200ℓ/10a)	ハダニ類	14日前	月 日		
アフエットフロアブル(治) (2000倍・200ℓ/10a)	灰色かび病、晩腐病 黒とう病、うどんこ病 褐斑病、さび病	7日前	月 日	月 日	月 日
ジマンダイセン水和剤(予) (1000倍・200ℓ/10a)	晩腐病、褐斑病、さび病、ハ と病、黒とう病	45日前	月 日	月 日	
ベンレート水和剤(治) (2000倍・200ℓ/10a)	褐斑病、うどんこ病、灰色か び病、晩腐病、黒とう病、芽 枯病	45日前	月 日	月 日	月 日
ホライズンドライフロアブル(治) (2500倍・200ℓ/10a)	ハと病、晩腐病、黒とう病、 褐斑病	21日前	月 日	月 日	月 日
レーバスフロアブル(治) (2000倍・200ℓ/10a)	ハと病	7日前	月 日	月 日	月 日
トップジンM水和剤 (1000倍・200ℓ/10a)	灰色かび病、褐斑病 黒とう病、うどんこ病 灰色かび病、芽枯病、芽腐病	45日前	月 日		
アーデント水和剤 (1000倍・200ℓ/10a) 4回	アザミウマ類、ハダニ類 フタテンヒメヨコバイ	7日前	月 日	月 日	月 日
コテツフロアブル (2000倍・200ℓ/10a)	チャノアザミウマ、フタテヒメヨコ バイ、コナカイガラムシ類、ブドウ カミナリ、カミシラミ類	60日前	月 日	月 日	
ダニサラバフロアブル (1000倍・200ℓ/10a)	ハダニ類 ブドウヒメハダニ	前日	月 日	月 日	
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。
 ※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。

トップジンM水和剤 (1000倍・200ℓ/10a)	灰色かび病、褐斑病 黒とう病、うどんこ病	45日前	月 日		
アーデント水和剤 (1000倍・200ℓ/10a) 4回	アザミウマ類、ハダニ類 フタテンヒメヨコバイ	7日前	月 日	月 日	月 日
コテツフロアブル (2000倍・200ℓ/10a)	チャノイアザミウマ、フタテンヒメヨコバイ、ミカンイアザミウマ、ブドウザミウマ類	60日前	月 日	月 日	
ダニサラバフロアブル (1000倍・200ℓ/10a)	ハダニ類 ブドウヒメハダニ	前日	月 日	月 日	