

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。  
 ※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員  
確認欄

/

印

会員番号		氏名		栽培面積		m <sup>2</sup>		
作物名	ブロッコリー		栽培圃場地番					
播種日	月	日	定植日	月	日	収穫開始日	月	日

<作業/施肥> (※50kg/10a = 50g/1m<sup>2</sup>、100ℓ/10a = 100mℓ/1m<sup>2</sup>)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。 登録内容：2024.4現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病虫害	使用 時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
アクタラ粒剤5 (2g/株)株元散布	コナガ、アオムシ ハイマダラノメイガ	育苗期 後半	月 日		
グレースシア乳剤 (2000倍・100ℓ/10a)	アムシ、ウバ類、材カコガ、コ ガ、アミミ、ハイマダラノ メイガ	7日前	月 日	月 日	
コルト顆粒水和剤 (4000倍・100ℓ/10a)	アブラムシ類	前日	月 日	月 日	月 日
コテツフロアブル (2000倍・100ℓ/10a)	コナガ、アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ	3日前	月 日	月 日	
アフーム乳剤 (1000倍・100ℓ/10a)	アオムシ、コナガ オオタバコガ、ヨトウムシ	3日前	月 日	月 日	月 日
オラクル顆粒水和剤 (300g/10a)全面散布後土壌混和	根こぶ病	定植前	月 日	月 日	
スターナ水和剤(治) (2000倍・100ℓ/10a)	軟腐病、黒斑細菌病 花蕾腐敗病	14日前	月 日	月 日	
キノンドー水和剤40(予) (800倍・100ℓ/10a)	黒腐病、黒斑細菌病	14日前	月 日	月 日	月 日
カンタスドライフロアブル(治) (1500倍・100ℓ/10a)	菌核病	7日前	月 日	月 日	
カスミンポルドー(予+治) (1000倍・100ℓ/10a)4回	黒腐病	7日前	月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。  
 ※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。