

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。
 ※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員
確認欄

/

印

会員番号		氏名		栽培面積	
作物名	みかん(柑橘)		栽培圃場地番		
播種日	月	日	定植日	月	日
				収穫開始日	月
					日

<作業/施肥> (※50kg/10a = 50g/1m²、100ℓ/10a = 100mℓ/1m²)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。 登録内容: 2024.4現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病虫害	使用 時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
スタークル顆粒水溶剤 (1000倍・200ℓ/10a)	チャノキイロアザミウマ コナカイガラムシ類 アブラムシ類(2000倍)	前日	月 日	月 日	月 日
コテツフロアブル (2000倍・200ℓ/10a)	アザミウマ類 チャノホコリダニ ミカンサビダニ	前日	月 日	月 日	
コルト顆粒水和剤 (2000倍・200ℓ/10a)	カイガラムシ類 アブラムシ類(4000倍) コナジラミ類(3000倍)	前日	月 日	月 日	月 日
カスケード乳剤 (1000倍・200ℓ/10a)	ミカンハダニ ミカハダニ(2000倍) チャノホコリダニ(2000倍)	7日前	月 日	月 日	
ダニサラハフロアブル (1000倍・200ℓ/10a)	ミカンハダニ	前日	月 日	月 日	
マイトコーネフロアブル (1000倍・200ℓ/10a)	ミカンサビダニ ミカンハダニ	7日前	月 日		
ジマンダイセン水和剤(予) (400倍・200ℓ/10a) 4回	褐色腐敗病、黒点病、そうか 病、炭疽病(さび果)、チャノ ホコリダニ、ミカハダニ(1000倍)	30日前	月 日	月 日	月 日
ランマンフロアブル(予) (2000倍・200ℓ/10a)	褐色腐敗病	前日	月 日	月 日	月 日
ロブラール水和剤(予) (1000倍・200ℓ/10a)	灰色かび病 黄斑病 黒腐病	7日前	月 日	月 日	月 日
トップジンM水和剤(治) (2000倍・200ℓ/10a) 5回	貯蔵病害(緑かび病、青かび 病、軸腐病)、そうか病(1000 倍)、灰色かび病(1000倍)	前日	月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。
 ※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。