

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。
 ※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員
確認欄

/

印

会員番号		氏名		栽培面積		m ²		
作物名	メロン		栽培圃場地番					
播種日	月	日	定植日	月	日	収穫開始日	月	日

<作業/施肥>

(※50kg/10a = 50g/1m²、100ℓ/10a = 100mℓ/1m²)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

農薬は散布しましたか？ はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。

登録内容：2024.4現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病虫害	使用 時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
アドマイヤー1粒剤 (2g/株) 植穴又は株元土壌混和	アブラムシ類、アザミヤカ類 コナジラミ類	定植時	月 日		
アフーム乳剤 (2000倍・200ℓ/10a)	アザミヤカ類、ウレシバ、 コナジラミ類、アゲハ類	前日	月 日	月 日	
モスピラン顆粒水溶剤 (8000倍・200ℓ/10a)	アブラムシ類	3日前	月 日	月 日	月 日
スタークル顆粒水溶剤 (2000倍・200ℓ/10a)	アザミヤカ類、コナジラミ類 アブラムシ類(3000倍)	3日前	月 日	月 日	
スターマイトフロアブル (2000倍・200ℓ/10a)	ハダニ類	前日	月 日		
コロマイト乳剤 (1000倍・200ℓ/10a)	コナジラミ類、ハダニ類、 ハモグリバエ類	前日	月 日	月 日	
ジマンダイセン水和剤(予) (400倍・200ℓ/10a) 5回	疫病、炭疽病、つる枯病、 斑点細菌病、べと病	7日前	月 日	月 日	月 日
ダコニール1000(予) (1000倍・200ℓ/10a) 5回	つる枯病 べと病(700倍) うどんこ病(700倍)	3日前	月 日	月 日	月 日
アフェットフロアブル(治) (2000倍・200ℓ/10a)	うどんこ病、つる枯病	前日	月 日	月 日	月 日
トリフミン水和剤(治) (3000倍・200ℓ/10a) 5回	うどんこ病、陥没病 つる枯病	前日	月 日	月 日	月 日
アミスター20フロアブル(治) (2000倍・200ℓ/10a) 4回	べと病、つる枯病、 うどんこ病	前日	月 日	月 日	月 日
ロブロール水和剤(予) (1000倍・200ℓ/10a) 4回	菌核病 つる枯病	前日	月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。

※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。